

# Murin Block Extreme



## Murin Block Extreme

Esca rodenticida pronta all'uso

### Titolare dell'autorizzazione e officina di produzione

Vebi Istituto Biochimico S.r.l.  
Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD), Italia  
Tel. +39 049 9337111  
Fax +39 049 5798263  
www.vebi.it

### Registrazione

Reg. Min. della Salute n. IT/2018/00458/AUT

### Aspetto e colore

Solido, blu

### Composizione

100 g di prodotto contengono:

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)       | 0,0025 g     |
| Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) | 0,001 g      |
| Coformulanti e sostanze appetibili   | q.b. a 100 g |

### Specifiche Prodotto

| Codice | Confezione  | Cartone  |
|--------|-------------|----------|
| 01822  | Busta 300 g | 24 pezzi |

## Caratteristiche Tecniche

**Murin Block Extreme** è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), anche dopo una singola ingestione.

**Murin Block Extreme** può essere usato all'interno ed intorno degli edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.

**Organismi target:** Topolino domestico (*Mus musculus*), sia giovani che adulti, Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), sia giovani che adulti.

## Dosi e modalità di impiego

**Uso all'interno di edifici.**

**Per il controllo del Topolino domestico (*Mus musculus*).**

Posizionare 20-40 g di **Murin Block Extreme** per contenitore, pari a 2-4 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 10-15 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente. Ciò al fine di verificare l'integrità del contenitore, il consumo dell'esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l'esca.

**Uso all'interno di edifici.**

**Per il controllo del Ratto grigio (*Rattus norvegicus*).**

Posizionare 100-200 g di **Murin Block Extreme** per contenitore, pari a 10-20 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente. Ciò al fine di verificare l'integrità del contenitore, il consumo dell'esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l'esca.

**Uso all'esterno intorno agli edifici.**

**Per il controllo del Ratto grigio (*Rattus norvegicus*).**

Posizionare 100-200 g di **Murin Block Extreme** per contenitore, pari a 10-20 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. Posizionare i contenitori con le esche in aree non soggette ad allagamenti. Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate da acqua o contaminate da sporcizia. I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire il contenitore quando necessario.

## Avvertenze

Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare il contenitore chiuso e al riparo dalla luce diretta del sole. Conservare in un luogo inaccessibile per bambini, uccelli, animali domestici e da fattoria.